


**Test della griglia di Amsler per il  
riconoscimento precoce della  
degenerazione maculare correlata all'età**



# Guida all'utilizzo della griglia di Amsler

Potrà eseguire il test con qualsiasi paziente, in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, in maniera semplice:

- 
1. Se il paziente utilizza per leggere mezzi ausiliari ottici (occhiali, lenti a contatto), li dovrà portare anche durante il test.



- 
2. Faccia coprire al paziente un occhio con il palmo della mano.



- 
3. Sistemi davanti al paziente la griglia di Amsler a una comoda distanza di lettura (30 - 40 cm) in un ambiente ben illuminato.

- 
4. Chieda al paziente di fissare con l'altro occhio il punto nero al centro della griglia.

- 
5. Senza che il paziente smetta di fissare il punto, gli chieda come appare il resto della griglia.

- 
6. Il paziente dovrà evitare di lasciare scorrere lo sguardo sulla griglia.

- 
7. Inviti il paziente a ripetere il test con l'altro occhio.



- 
8. Risultato del test:

- Sono visibili zone vuote, deformate, sfocate o linee ondulate?
- Ci sono quadrati di dimensioni differenti o sembra che manchino dei quadrati?
- Non sono visibili tutti e 4 gli angoli della griglia di Amsler?

---

**Se notasse delle irregolarità, intraprenda i passi necessari.**

---

Sotto il patronato di



**Retina Suisse**